

	St Pargoire- 10 janvier 2018 matin 1ère partie de l'itinéraire sur molasse			1-1-Talus de l'ancienne voie ferrée : <u>identifications soignées ou/et souvent vérifiées avec flore med</u>
	Aspect de la plante (de mémoire) : P = plante seulement en feuilles, rosettes.. F =plante fleurie V =plante vivante avec fruits de 2018 S = plante morte desséchée			
noms latins	noms communs	Famille	aspect	Ecologie et phytosociologie de Flora Gallica
<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f. ou <i>Allium ampeloprasum</i> L.? <i>trop jeunes</i>	A.polyanthum , poireau des vignes, ail à nombr.fleurs / A.ampelloprasum , carambole, gros ail, ail à grosse tête	Amaryllidacées	P	Pelouses, rocailles et friches thermophiles; Friches eutrophiles mésohygroph. subhalophiles
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	bugle ivette, ivette musquée	Lamiacées	P, F	pelouses mésoxérophiles basiphiles médit.
<i>Antirrhinum majus</i> L. subsp non déterminée majus ou tortuosum ?	gueule de loup	Plantaginacées	P, F	rochers, vieux murs..
<i>Arum italicum</i> Mill.	arum d'Italie, gouet d'Italie, Pied-de-veau	Aracées	P	sous bois herbacés eutrophiles, medit. atlant.
<i>Arundo donax</i> L. sur talus près ruisseau	canne de provence	Poacées	V	prairies méso- à hygrophiles eutrophiles
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	asperge à feuilles aiguës, asperge piquante ...	Asparagacées	V	chênaies vertes, garrigues méso et thermomédit.
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt. (Psoralea bituminosa L.)	Herbe au bitume, Psoralée à odeur de bitume, Psoralier, Trèfle bitumineux	Fabacées	P, F	friches eutrophiles méso- à xérophiles
<i>Borago officinalis</i> L.	bourrache	Boraginacées	P	cultures, friches eutrophiles
<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.)Herter	Barbon andropogon ou coiron	Poacées	V	friches eutrophiles thermophiles /néotrop. Natur.
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv.	brachypode rameux, baouque, herbe à moutons	Poacées	p	pelouses xérophiles médit, ouverture des fruticées
<i>Calendula arvensis</i> L.	souci des champs	Astéracées	F	cultures, friches eutrophiles
<i>Carthamus lanatus</i> L.	carthame laineux	Astéracées	S	cultur., friches à thérophytes eutrophiles thermophiles
<i>Centaurea aspera</i> L. subsp <i>aspera</i>	centaurée rude	Astéracées	F	friches xérophiles ouvertes surtout psammophiles
<i>Cistus albidus</i> L.	ciste blanc ou cotonneux	Cistacées	P	garrigues et parfois maquis
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	ciste de Montpellier - 3 pieds trouvés à 1 seul endroit bord sentier sur argile ?	Cistacées	P	maquis, sous bois clairs sur silice

<i>Clematis flammula</i> L.	clématite flammette, brûlante, poivrée ...	Ranunculacées	P	matorrals héliophiles neutroclines, bois clairs ..
<i>Clematis vitalba</i> L.	clématite des haies, vigne blanche, herbe aux gueux ...	Ranunculacées	V	bois, coupes, fourrés planitiaires à montagnards
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) kuntze (<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi)	Baume sauvage, Calament à petites fleurs ou glanduleux ou népéta, Fausse Marjolaine, Sarriette calament ou népéta ...	Lamiacées	F	pelouses et friches meso à thermophiles
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp non déterminée	cornouiller sanguin, bois puant, bois punais ...	Cornacées		fourrés et lisières eutrophiles
<i>Coronilla glauca</i> L. (C. valentina subsp glauca)	coronille glauque	Fabacées	V	matorrals méditerranéens
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	aubépine à un style ou monogyne, bois de mai, épine blanche ...	Rosacées		friches méso à xérophiles, haies, fourrés, garrigues
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp nondéterminée	dactyle aggloméré ou pelotonné, pied-de-poule ...	Poacées	V	
<i>Daucus carota</i> L. subsp non déterminée	carotte sauvage	Apiacées	F	
<i>Diplotaxis erucoïdes</i> (L.) DC.	fausse roquette, roquette blanche	Brassicacées	P, F	cultures, friches eutrophiles à théroph. thermophiles
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC	Roquette jaune, Diplotaxis à feuilles étroites ou à feuilles ténues ...	Brassicacées	V	friches mésophiles à xérophiles vivaces
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter subsp <i>viscosa</i>	inule visqueuse	Astéracées	V	friches eutrophiles thermophiles ouvertes
<i>Echium vulgare</i> L.	vipérine commune	Boraginacées	P	friches thermophiles eutrophiles, pelouses xérophiles
<i>Erigeron sp. peut-être E.sumatrensis</i> (<i>Conyza sumatrensis</i>)	érigeron ou vergerette peut être de Sumatra / d' Amérique centrale	Astéracées	F, V	friches
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'her. subsp non déterminée	bec-de-grue à feuilles de ciguë, érodium à feuilles de ciguë..	Géraniacées	F	pelouses à thérophytes psammophiles
<i>Erodium malacoides</i> (L.)L'Hér.	érodium ou bec-de-grue à feuilles de mauve ou fausse mauve	Géraniacées	F	friches à thérophytes eutrophiles
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland ou roulant, Panicaud champêtre ou des champs	Apiacées	S	pelouses et friches méso- à xérophiles surtout basiphiles
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp non vérifiée	euphorbe à feuilles d'amandier ou des bois, Herbe à la faux	Euphorbiacées	P	sous-bois herbacés médio-européens

<i>Euphorbia characias</i> L. subsp non vérifiée	euphorbe characias ou des garrigues	Euphorbiacées	P	garrigues, friches vivaces thermophiles
<i>Euphorbia nicaeensis</i> All.	euphorbe de Nice	Euphorbiacées	P	garrigues
<i>Euphorbia segetalis</i> L. subsp non vérifiée	euphorbe des moissons	Euphorbiacées	F	sables et rochers littoraux, friches de l'int. et annuelles commensales des cult. sarclées basophiles méditerranéennes
<i>Ficus carica</i> L.	figuier	Moracées		matorrals mésomédit., héliophiles neutroclines
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp <i>vulgare</i>	fenouil commun	Apiacées	V	friches thermophiles
<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.	fumana fausse-bruyère	Cistacées	V	pelouses arides basiphiles
<i>Galactites tomentosus</i> Moench	chardon laiteux, galactitès ou galactite cotonneux ou tomenteux	Astéracées	P	friches xérophiles méditerranéennes
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet accrochant, Gaillet gratteron	Rubiacées	P	champs cultivés, groupements rudéraux
<i>Geranium purpureum</i> Vill. (G.robertianum subsp purpureum (Vill.)Nyman)	géranium pourpre	Géraniacées	P	rocailles et ourlets xérothermophiles
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	géranium à feuilles rondes, mauvette...	Géraniacées	P	pieds de haies, friches eutrophiles
<i>Globularia bisnagarica</i> L. d'après feuilles	Globulaire allongée ou ponctuée	Plantaginacées	P	pelouses xérophiles basiphiles
<i>Hedera helix</i> L.	lierre grimpant, herbe de st jean, bourreau des arbres ...	Araliacées	V	bois, rocailles ombragées, vieux murs
<i>Helianthemum nummularium</i>(L.) Mill	hélianthème à feuilles arrondies, jaune, nummulaire ou tomenteux	Cistacées	P	rocailles, pelouses, basophiles médio-européennes occident.
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench subsp <i>stoechas</i>	Immortelle, immortelle d'Hyères ou stoechas ...	Astéracées	V	pelouses xérothermophiles ouvertes surtout basiphiles
<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P.Delforge (<i>Barlia robertiana</i> (Loisel) Greuter)	orchis à longues bractées, orchis géant, barlie	Orchidacées	P	pelouses xérophiles basiphiles medit. méso à eutrophiles
<i>Iris germanica</i> L.	iris des jardins ou d'Allemagne	Iridacées	P	pelouses rocailleuses
<i>Jasminum fruticans</i> L.	jasmin buissonnant, ligneux ou jaune..	Oléacées	V	matorrals médit. et fourrés thermophiles
<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp <i>oxycedrus</i>	genévrier oxycèdre ou cade	Cupressacées		
<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier sauce	Lauracées		matorrals médit. hygrosclaphiles, surtout ripisylves

<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Aspic, grande Lavande, lavande à feuilles larges, Lavande spic...	Lamiacées	V, F	garrigues et pelouses xérophiles basiphiles
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill	linaire à fleurs striées	Plantaginacées	P	éboulis, rocailles, coupes forestières herbacées
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	chèvrefeuille des Baléares ou entrelacé	Caprifoliacées		matorrals méditerranéens
<i>Lotus dorycnium</i> L. (Dorycnium pentaphyllum Scop)	badasse, dorycnie à 5 feuilles, dorycnie sous-ligneuse	Fabacées	P	garrigues et ourlets thermophiles basiphiles
<i>Malva sylvestris</i> L.	grande mauve, mauve sauvage ...	Malvacées	P	friches vivaces eutrophiles
<i>Mercurialis tomentosa</i> L.	mercuriale tomenteuse / uniqt en Lang.Rouss.	Euphorbiacées	P	friches vivaces xérophiles surtout basiphile
<i>Misopathes orontium</i> (L.) Dumort. ?	mufler des champs ou rubicond, tête-de-mort	Plantaginacées	F	culture, pelouses à thérophytes méditerr. surtout sur silice !
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv. peut-être et subsp non déterminée = subsp luteus	odontite ou odontitès jaune, euphrase jaune	Orobanchacées	S	pelouses et ourlets xérothermophiles
<i>Olea europea</i> L. subsp <i>europaea</i>	olivier commun, sauvage	Oléacées		fouffrés méditerranéens
<i>Osyris alba</i> L.	Osyris blanc, Rouvet, Rouvet blanc	Santalacées	V	ourlets, pelouses et rocailles xérothermophiles
<i>Parietaria judaica</i> L.	pariétaire couchée ou de Judée ou diffuse ...	Urticacées	P	rochers, murs et ourlets eutrophisés
<i>Phagnalon sordidum</i> (L.) Rchb.	Phagnalon repoussant ou sordide	Astéracées	V	rochers et vieux murs calcaires
<i>Picris hieracioides</i> L.	picride fausse épervière ...	Astéracées	F	friches vivaces eutrophiles
<i>Pinus pinea</i> L.	pin pignon ou pin parasol	Pinacées		ici planté sur une parcelle
<i>Pistacius lentiscus</i> L.	pistachier lentisque, arbre au mastic	Anacardiacees		matorrals méditerranéens
<i>Plantago lanceolata</i> L.	plantain lancéolé	Plantaginacées	P	pelouses et friches mesoxérophiles à mésohygrophiles
<i>Poterium sanguisorba</i> L.	pimprenelle	Rosacées	P, F	prairies, friches basiphiles
<i>Prunus avium</i> L. (Cerasus avium L. Moench.)	merisier, ici cerisier	Rosacées		forêts caducifoliées mais nul en plaines médit!!!
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.)D.A. Webb	Amandier	Rosacées		ici planté
<i>Prunus mahaleb</i> L.	prunier ou cerisier de ste Lucie, amarel	Rosacées		fouffrés thermocalcicoles
<i>Quercus coccifera</i> L.	chêne kermès	Fagacées		garrigues
<i>Quercus ilex</i> L.	chêne vert, yeuse	Fagacées		forêts méditerranéo-atlantiques, surtout calcicoles
<i>Quercus pubescens</i> Willd. (Q.humilis Mill)	chêne pubescent, chêne blanc	Fagacées		forêts thermophiles, prés-bois, surtout sur calcaire
<i>Ranunculus bulbosus</i> L	renoncule bulbeuse	Ranunculacées	p	pelouses et prairies ± thermophiles
<i>Reichardia picroides</i> L. (Roth)	Cousteline ou reichardie	Astracées	F	pelouses ouvertes, friches et rocailles thermophiles
<i>Rubia peregrina</i> L. subsp	garance voyageuse	Rubiacees	P	ourlets et fouffrés thermophiles

<i>peregrina</i>				
Rubus peut être "section discolor"	ronce (feuilles blanches dessous)	Rosacées	P	
Ruta angustifolia Pers.	rue à feuilles étroites	Rutacées	P	garrigues méditerranéennes
Ruta montana (L.) L.	rue des montagnes	Rutacées	P	pelouses médit. mésoxérophiles surtout basiphiles
Salvia verbenaca L. ? subsp clandestina (L.) batt.	sauge clandestine	Lamiacées	P	pelouses xérophiles ouvertes surtout basiphiles
Scabiosa atropurpurea L. (<i>Sixalis atropurpurea</i> subsp <i>maritima</i>)	scabieuse maritime	Caprifoliacées	P, F	pelouses sablonneuses
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják ?	scirpe-jonc	Cypéracées	P	prairies hygrophiles sur substrat minéralisé
Sedum sediforme Jacq. (Pau)	orpin élevé	Crassulacées	P	biotopes secs et ouverts surtout sur calcaire
Seseli tortuosum L.	séséli tortueux	Apiacées	S	pelouses et friches xérophiles basiphiles
Silene latifolia Poir.	silène à larges feuilles, lychnis à grosses graines	Caryophyllacées	P, V	friches et ourlets vivaces eutrophiles, parfois cultures
Smilax aspera L.	salsepareille, liseron épineux ..	Smilacacées	V	matorrals thermophiles
Solanum villosum Mill. subsp ?	morelle poilue ou velue	Solanacées	P, F, V	friches à thérophytes eutrophiles
Sonchus oleraceus L.	laiteron potager	Astéracées	P, F	friches annuelles eutrophiles
Sonchus tenerrimus L.	laiteron délicat	Astéracées	P	friches vivaces xérophiles
Stachys dubia L.	stachys douteuse	Astéracées	P	rocaillies et garrigues basiphiles
Stellaria media (L.) Vill	mouron blanc ou des oiseaux , morgeline, stellaire interm.	Caryophyllacées	P, F	cultures, friches et ourlets à thérophytes eutrophiles
Tamarix sp	tamaris	Tamaricacées		
Thymus vulgaris L. subsp vulgaris	Thym commun, farigoule	Lamiacées	P	garrigues et pelouses xérophiles, basiphiles
Trifolium angustifolium L.	queue-de-renard, trèfle à feuilles étroites ..	Fabacées	S	pelouses à thérophytes ± eutrophiles
Tripodion tetraphyllum (L.)Fourr. (<i>Anthyllis tetraphylla</i> L.)	Anthyllide ou anthyllis à quatre feuilles	Fabacées	P	pelouses sèches à thérophytes, cultures
Ulmus minor Mill.	Ormeau, orme champêtre, petit orme	Ulmacées		forêts eutrophiles, mésohygrophiles
Urospermum dalechampii (L.) F.W.Schmidt	urosperme de Dalechamps	Astéracées	P	friches vivaces xérophiles méditerranéennes
Verbascum sinuatum L. ? les feuilles devraient être pennatilobées	molène sinuée	Scrophulariacées	P	friches xérophiles
Veronica hederifolia L.	véronique à feuilles de lierre	Plantaginacées	P, F	lieux cultivés ou sablonneux
Veronica persica Poir. ou ? V.polita Fries.	véronique de Perse véronique brillante	Plantaginacées	P, F	friches à thérophytes surtout eutrophiles, cultur. ou ? Pelouses rudéralisées, cultures

Voir Botamycos				
<i>Viburnum tinus</i> L.	viorne-tin ou laurier-tin	Adoxacées	F	matorrals méditerranéens ± sciaphiles
	<u>1-2- Le long de la D30 route de Villeveyrac et près villa malgré : identifications rapides non vérifiées sur une flore</u>			
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.	concombre ou cornichon d'âne, momordique	Cucurbitacées	V	terrains vagues, décombres
<i>Fumaria capreolata</i> L.	fumeterre grimpante, blanche ou capréolée	Papavéracées	P, F	ourlets et friches à thérophytes thermophiles
<i>Lactuca serriola</i> L.	laitue scariole, scarole ou serriole, scarole, escarole...	Astéracées	P	friches eutrophiles thermophiles
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv; subsp maritima (Alyssum maritimum)	lobulaire maritime, alysse ou alysson ou alyssum marit., corbeille-d'argent annuelle	Brassicacées	P, F	pelouses basiphiles mésoxérophiles surtout littorales
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	menthe odorante, suave ou à filles rondes ...	Lamiacées	P	prairies et friches méso- à hygrophiles, fossés
<i>Piptatherum</i> sp	piptatherum	Poacées	V	
<i>Silene latifolia</i> Poir.	silène à larges feuilles, lychnis à grosses graines	Caryophyllacées	P, F	friches et ourlets vivaces eutrophiles, parfois cultures
<i>Symphiotrichum subulatum</i> (Michx) G.L. Nesom n'existe plus dans Flora gallica !	aster écailleux	Astéracées	P	pelouses temporairement humides, mares !!! Nous l'avons observé très vite en sous bois chênes verts
<i>Torilis</i> sp			S	
<i>Trigonella alba</i> (Medik) Coulot et Rabaute (Melilotus albus medik.)	mélilot blanc	Fabacées	F	friches vivaces eutrophiles

Yolande Conèjos