

432. — *Mercurialis* L. (1)

- 1 Pl. A. ; t. dressées ; rac. pivotante 2
- Pl. V. 4
- 2 Pl. monoïques : infl. monoïques régulières comprenant tj. une fl. ♀ cent. unique accompagnée d'une cyme ♂ multipare (s'il y a lieu, en présence de différents variants sexuels : fréquence des monoïques > 50 %) — « races » polyploïdes de *M. annua* L., d'ailleurs ttes localisées ds la R.-m.
1772. — *M. ambigua* L. fil.
- Pl. dioïques : fréquence des intersexués ou des monoïques très faible, n'excédant jamais 15 % 3
- 3 Infl. ♂ comprenant de 4 à 12 glomérules cymeux de fl. ♂ ; taille élevée > 20 cm ; nb. des dents marginales foliaires élevé, compris entre 6 et 20 ; dents foliaires arrondies se recouvrant l'une l'autre ; pétiole court ; filles et carpelles nettement ciliés ; capsule large de 5 à 7 mm — floraison en ttes saisons — nitrophile : cultures, décombres, jachères, jardins, champs (*Chenopodietalia*) à l'étage inf. — tte la Fr. ; Co. — TC — Paléo-temp..
1773. — *M. annua* L.
- Infl. ♂ ne comprenant que 2 ou 3 glomérules cymeux de fl. ♂ ; pl. naine ne dépassant pas 15 cm de ht, peu ramifiée ; dents marginales ne se recouvrant pas l'une l'autre, en nb. compris entre 1 et 5 ; pétiole long égalant la moitié de la longueur du limbe ; filles et capsules glabres ou très faibl. ciliées ; capsule petite, large de 2 à 4 mm ; couleur vert foncé — Fév.-Jn — roc. calc. (*Asplenietalia Petrarchae*) et grpts du *Thero-Brachypodion* sur les vires et replats rocheux à l'étage inf. de la R.-m. — Endém. française.
1774. — *M. Huetii* Henry
- 4 T. herb. peu ramifiée à stolons ; rac. fasciculées ; filles larges, vertes, velues, à dents marginales nb. et arrondies ; infl. ♂ développées (nb. de glomérules cymeux > 4) ; fl. ♀ pédonculées ; capsule large de 6 à

8 mm, ciliée — Av.-Jn — \pm calcicole, forêts (*Quercus-Fagetea*) aux étages inf. et mont. ds tte la Fr. et en Co. — Eur. ; Caucase.

1775. — **M. perennis** L.

— Pl. ligneuses à rac. pivotante 5

- 5 Filles argentées, subsessiles, ent. ou peu dentées, épaisses ; pl. recouverte d'un abondant duvet blanc ; épi δ pauvre, ne comportant que 2 ou 3 glomérules de fl. δ ; fl. φ solitaires sessiles — Av.-Oct. — lieux arides, décombres — Midi (B.-du-R., Hér., Aude, Pyr.-or.) — W-Médit..

1776. — **M. tomentosa** L.

- Filles vertes glabres, peu dentées, peu épaisses, épi δ pauvre ; fl. φ solitaires ; capsule lisse et glabre — Mai-Sept. — 0-1 500 m, mais R entre 0-400 m — lieux ombragés — B.-du-R., Hér., Aude, Pyr.-or. — Endém. cyrno-sarde.

1777. — **M. corsica** Coss.